

## ZASADY PIELĘGNACJI ZIELENI NA PSZOK

### ZAWCIĄG NADMORSKI

Odmiana „Alba” to zimozielona bylina o ciemnozielonym ulistnieniu. Kwitnie na biało od czerwca do października. Odmiana najbardziej odporna na niesprzyjające warunki zimą, dlatego zachowuje zielone ulistnienie aż do wiosny. Pielęgnacja polega jedynie na usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, co przedłuża jej kwitnienie.

### BERBERYS „ERECTA”

Jest to rosnący wąsko kolumnowo ciernisty krzew osiągający 1,5 m wysokości. Kwitnie w maju na żółto, natomiast jesienią jego liście przebarwiają się na purpurowo. Nie wymaga regularnego cięcia. Co dwa lata wczesną wiosną można przeprowadzić prześwietlanie krzewów polegające na usuwaniu kilku najstarszych pędów. Berberysy przycinane zbyt intensywnie wytwarzają liczne młode pędy nadmiernie zagęszczające krzewy, a poza tym przestają kwitnąć. Silniejsze cięcie można przeprowadzić, gdy chcemy uzyskać równą i zagęszczoną płaszczyznę. Cięcie wykonujemy w kwietniu - maju po kwitnieniu lub w lipcu – sierpniu na żywoptot.

### OWIES WIECZNIE ZIELONY

Są to kępy traw rosnące do ok. 40 cm. W czerwcu – lipcu wyrastają kłosa na wysokość 1 m. Jest zimozielony. Nie wymaga przycinania, jedynie wyczesania suchych źdźbeł trawy. Wczesną wiosną wycinać suche kwiatostany.

### CHIONKA KANADYJSKA

Początkowo wolnorosnąca zimozielona roślina o krótkich igłach i przewieszających się pędach. Preferuje glebę wilgotną zawierającą dużo związków mineralnych. Choiny bardzo dobrze znoszą cięcie i formowanie dzięki czemu znacznie się rozgałęziają i zagęszczają. W pierwszych latach po posadzeniu ciąć głównie po bokach rośliny ograniczając się do pędów jednorocznych. Górę żywoptotu ciąć dopiero po osiągnięciu żądanej wysokości. Cięcie przeprowadzać z dołu do góry tak, żeby pionowy przekrój przypominał trapez (podstawa szersza od górnej powierzchni). Cięcie bardzo młodych roślin nie jest konieczne. Pierwsze cięcie wykonujemy przed rozpoczęciem wegetacji, czyli wczesną wiosną, drugie w okresie intensywnego wzrostu nowych pędów w czerwcu, ostatecznie po zakończeniu wzrostu pod koniec lata w sierpniu. Starsze rośliny można ograniczyć do dwóch cięć: wiosną i pod koniec lata.

### DEREŃ

Krzew o dekoracyjnych czerwonych pędach, dorasta do 3 m wysokości. Preferuje wilgotne gleby. Może swobodnie rosnąć lub być formowany na żywoptot. Dobrze znosi cięcie, które pobudza krzewy do wybijania młodych pędów o intensywniej barwie kory i liści. Przycinamy je na przedwiośniu.

### BARWINEK

Odmiana kwitnąca w maju-sierpniu na biało, tworząca zwarty kobierzec. Pielęgnację roślin można ograniczyć do jesiennego przycięcia zbyt długich płaczących się pędów i uformowaniu zwartych kęp.

### RUNIANKA JAPOŃSKA

Ta zimozielona krzewinka, rozrastająca się rozłogowo osiąga ok. 20 cm wysokości. Kwitnie na biało w kwietniu. Lubi gleby wilgotne. Można ją przyciąć na wiosnę, co spowoduje jej zagęszczenie.

### BLUSZCZ POSPOLITY

Jest to zimozielone pnącze osiągające ok. 20 m wysokości o przyrostach rocznych 0,5 - 1 m. Lubi glebę wilgotną. W mroźne zimy może przemarzać. Bluszcz nie wymaga specjalnego formowania. Na wiosnę

należy usunąć pędy uszkodzone przez mróz, a także zbyt długie. Przycinać późną wiosną i ponownie pod koniec lata.

#### WINOBLUSZCZ TRÓJKLAPOWY

Pnącze osiąga wysokość ok. 20 m z rocznymi przyrostami 1-2 m. Jesienią przebarwia się na szkarłatnoczerwony kolor. W mroźne zimy może przemarzać. Cięcie tych roślin można ograniczyć do uformowania korony, gdyż większa liczba rozkrzewionych pędów ułatwi równomierne rozmieszczenie krzewu na ścianie. W następnych latach można dowolnie modelować kształt rośliny. Na ogół wystarczają dwa zabiegi: wiosną i latem.

Wszystkie rośliny muszą być regularnie nawadniane.

Szczególnie obficie należy podlewać rośliny zimozielone.

W okresie wiosennym i jesiennym powinny być zasilane odpowiednimi nawozami.